

## Szaktanácsadóink

### Nyugat-Magyarország

<b>Bujdosó Attila</b>	+36 30 6767 043	Nyugat-magyarországi értékesítési vezető	attila.bujdoso@kwizda.hu
<b>Erbár Ferenc</b>	+36 20 3665 311	Fejér vármegye	ferenc.erbar@kwizda.hu
<b>Fehér Tamás</b>	+36 30 982 0763	Somogy vármegye	tamas.feher@kwizda.hu
<b>Kovács András</b>	+36 30 722 5192	Veszprém, Komárom-Esztergom vármegye	andras.kovacs@kwizda.hu
<b>Lőrincz Erzsébet</b>	+36 30 861 3123	Vas vármegye	erzsebet.lorincz@kwizda.hu
<b>Mészáros Lili</b>	+36 30 237 4784	Zala vármegye	lili.meszaros@kwizda.hu
<b>Németh Tibor</b>	+36 20 610 7222	Fejér vármegye	tibor.nemeth@kwizda.hu
<b>Pinczehelyi Zoltán</b>	+36 20 610 7343	Tolna vármegye	zoltan.pinczehelyi@kwizda.hu
<b>Sebestyén István</b>	+36 30 982 0766	Baranya vármegye	istvan.sebestyen@kwizda.hu
<b>Treitz János</b>	+36 30 313 4406	Somogy vármegye	janos.treitz@kwizda.hu
<b>Varga Balázs</b>	+36 30 2222 584	Győr-Moson-Sopron vármegye	balazs.varga@kwizda.hu
<b>Vejtey Csaba</b>	+36 30 950 1336	Tolna megye	csaba.vejtey@kwizda.hu

### Kelet-Magyarország

<b>Kiss András</b>	+36 20 947 6141	Kelet-magyarországi értékesítési vezető	andras.kiss@kwizda.hu
<b>Csatordai László</b>	+36 30 2126 242	Csongrád-Csanád vármegye	laszlo.csatordai@kwizda.hu
<b>Czene András</b>	+36 30 567 5504	Hajdú-Bihar vármegye	andras.czene@kwizda.hu
<b>Juhász György</b>	+36 70 4254735	Szabolcs-Szatmár-Bereg, Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye	gyorgy.juhasz@kwizda.hu
<b>Klein Róbert</b>	+36 30 797 4574	Bács-Kiskun vármegye	robert.klein@kwizda.hu
<b>Kolozsvári László</b>	+36 30 580 4357	Békés vármegye	laszlo.kolozsvari@kwizda.hu
<b>Lakatos Péter</b>	+36 30 6988 490	Szabolcs-Szatmár-Bereg, Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye	peter.lakatos@kwizda.hu
<b>Leszko László</b>	+36 20 519 2750	Jász-Nagykun-Szolnok vármegye	laszlo.leszko@kwizda.hu
<b>Nagy Zsanett</b>	+36 30 306 0129	Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye	zsanett.nagy@kwizda.hu
<b>Oravecz Péter</b>	+36 30 978 3722	Heves vármegye	peter.oravecz@kwizda.hu
<b>Péter Ákos</b>	+36 30 972 1050	Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye	akos.peter@kwizda.hu
<b>Saska Szabolcs</b>	+36 20 464 0728	Pest, Nógrád vármegye	szabolcs.saska@kwizda.hu

**BRIDGE EXTRA  
50 WP**



**Kwizda**  
Agro

**Szója nélkülözhetetlen preemergens gyomirtó szere ön-magában vagy kombinációban Command 48 EC vagy Szója ECO készítményekkel.**

## Felhasználása és dózisa

Kultúra	Károsító	Kezelések maximális száma	Két kezelés közt eltelt minimális időtartam (nap)	Dózis (kg/ha)	Permetlé (l/ha)	Maximális dózis (kg/ha/év)	Kezelés időpontja (fenológiához viszonyítva)
<b>kukorica</b> (szemes, siló)	magról kelő kétszikű gyomnővények	1	-	0,08	200–300	0,08	preemergensen (BBCH 00–07)
<b>napraforgó</b>	magról kelő kétszikű gyomnővények	1	-	0,08	200–300	0,08	preemergensen (BBCH 00–07) vagy 2–4 leveles fejlettségénél (BBCH 12–14)
<b>szója</b>	magról kelő kétszikű gyomnővények	1	-	0,08	200–300	0,08	vetés előtt a talajba dolgozva (PPI), vagy preemergensen (BBCH 00–07)
<b>burgonya</b>	magról kelő kétszikű gyomnővények	1	-	0,08–0,1	200–300	0,1	preemergensen (BBCH 00–08)
<b>cirok</b>	magról kelő kétszikű gyomnővények	1	-	0,08	200–300	0,08	preemergensen (BBCH 00–07)
<b>szőlő</b> (3 évesnél idősebb telepítés)	magról kelő kétszikű gyomnővények	2	60	0,2–0,3	200–300	0,6	gyomnővények kelése előtt; magról kelő kétszikűek 2–6 leveles fejlettségekor
<b>csont-héjasok</b> (3 évesnél idősebb telepítés)	magról kelő kétszikű gyomnővények	2	60	0,2	200–300	0,4	gyomnővények kelése előtt; magról kelő kétszikűek 2–6 leveles fejlettségekor
<b>almatermésűek</b> (3 évesnél idősebb telepítés)	magról kelő kétszikű gyomnővények	2	60	0,2–0,3	200–300	0,6	gyomnővények kelése előtt; magról kelő kétszikűek 2–6 leveles fejlettségekor
<b>erdészeti</b> (tűlevelűek, lombos erdő)	magról kelő kétszikű gyomnővények	2	60	0,3–0,6	200–300	1,2	gyomnővények kelése előtt; magról kelő kétszikűek 2–6 leveles fejlettségekor
<b>őszi búza</b>	magról kelő kétszikű gyomnővények, <i>Apera spica-venti</i>	1	-	0,06	200–300	0,06	1 leveles állapottól bokrosodás kezdetéig (BBCH 11–21)
<b>díszfaiskola</b> (tuja, tiszafa, boróka és hamisciprus) 1 évesnél idősebb	magról kelő kétszikű gyomnővények	1	-	0,1–0,2	200–300	0,2	gyomnővények kelése előtt; magról kelő kétszikűek 2–6 leveles fejlettségekor

É.V.I: csont-héjasok: 45 nap, kukorica, napraforgó, szója, cirok, burgonya, szőlő, almatermésűek, őszi búza: előírás szerű felhasználás esetén nincs korlátozva.

## Előírt növényvédelmi technológia

**Kukoricában** (szemes, siló) a készítményt a kultúrnövény vetése után kelése előtt (preemergensen) kell kijuttatni.

**Napraforgóban** vetés után kelés előtt (preemergensen), és állománykezelés formájában is kijuttatható a készítmény. Állománykezelés esetén a kijuttatást a napraforgó, valamint a magról kelő kétszikű gyomnővények 2–4 valódi leveles korában kell elvégezni. Szikleveles napraforgót kezelni tilos, a javasoltnál fejlettebb állományban a kezelést követően a napraforgó levelein perzselésben megnyilvánuló fitotoxikus tünetek jelentkezhetnek!

**Szójában** a kezelést vetés előtt, 6–8 cm mélyen a talajba dolgozva (PPI) kell elvégezni, vagy vetés után kelés előtt (preemergensen) kell kipermetezni a készítményt, a vetést követő két napon belül.

**Burgonyában** ültetés után kelés előtt (preemergensen) a végleges bakhátakra kell kipermetezni a készítményt. A burgonya kelésekor lehulló nagyobb mennyiségű csapadék esetén a készítmény a kelő egyedeken perzselésben megnyilvánuló, múltó fitotoxikus tüneteket okozhat.

**Cirokban** a kultúrnövény vetése után kelése előtt (preemergensen) kell a készítményt kijuttatni.

**Szőlőben** (bor- és csemege), **csont-héjasokban** (kajszi, őszibarack, cseresznye, meggy, szilva, ringló), **almatermésűekben** (alma, körte, birs, naspolya) 3 évesnél idősebb telepítésekben alkalmazható. A kezelések elvégezhetőek kora tavasszal (preemergensen) növényi maradványoktól mentes jól elmunkált aprómorzás talajfelszínre, vagy állományban (posztemergensen) a magról kelő kétszikű gyomnővények 2–6 leveles fejlettségekor.

**Erdészeti kultúrákban** (tűlevelűek, lombos erdő) a telepítés évében ill. évétől alkalmazható kora tavasszal rügyattanás előtt preemergens, vagy posztemergens kijuttatással. Preemergens kijuttatás esetén a készítményt jól elmunkált aprómorzás talajfelszínre kell kijuttatni, posztemergens kezelésnél a magról kelő kétszikű gyomfajok 2–6 leveles állapotában kell a kezelést elvégezni. Erősebb gyomosodás, fejlettebb gyomnővények esetében az engedélyokiratban meghatározott magasabb dózisban kell alkalmazni. A készítmény kontakt perzselő hatású, az élőlő kétszikű gyomnővények föld feletti részeit leperzseli, de újraképzésüket nem akadályozza meg.

A gyomirtó hatás fokozására a készítményhez hatásfokozó adalékanyag adható.

**Őszi búzában** a készítményt őszi korai posztemergensen a kultúrnövény 1 leveles állapotától, vagy tavasszal az őszi búza bokrosodásának kezdetéig kell kijuttatni. A magról kelő kétszikű gyomfajok 2–4 valódi leveles korukban, a nagy széltiltippán (*Apera spica-venti*) 1–3 leveles korában a legérzékenyebb a készítményre.

**Díszfaiskolában** (tuja, tiszafa, boróka és hamisciprus fajok esetén), 1 évesnél idősebb állományban alkalmazható kora tavasszal a kultúrnövény fakadása előtt, gyomnővények szempontjából preemergens, vagy posztemergens kijuttatással. Preemergens kijuttatás esetén a készítményt jól elmunkált aprómorzás talajfelszínre kell kijuttatni, posztemergens kezelésnél a magról kelő kétszikű gyomfajok 2–6 leveles állapotában kell a kezelést elvégezni.

A készítmény kizárólag a magról kelő kétszikű gyomfajok, valamint *Apera spica-venti* ellen hatékony, egyéb egyszikű gyomnővények, valamint élőlő kétszikűek ellen az adott kultúrában ezek ellen engedélyezett egyéb gyomirtó készítmények alkalmazása szükséges.

## Hatásmechanizmus

A flumioxazin hatóanyag a HRAC „E” (HRAC 14), protoporfirinogén-oxidáz gátló herbicidcsoporton belül a dikarboxamidok hatóanyagcsoportba tartozik.

## Keverhetőség

Szójában Szója Eco vagy Command 48 EC készítménnyel keverhető és kipermetezhető. Napraforgóban csak preemergensen Inspector vagy Fidox 800 EC kombinálható. Napraforgónál magas szervesanyag tartalmú talajokon alkalmazzuk a kombinációt.

Összetevők	Formuláció	Forg. kategória	Hatásmód	Kiszerezés
500 g/kg flumioxazin	nedvesíthető por (WP)	I.	kontakt	1 kg-os doboz (5 x 0,2 kg)
Tárolhatóság			3 év	
Munkaegészségügyi várakozási idő			0 nap	
Méhveszélyesség			Nem jelölésköteles	
Tűzveszélyesség			Nem jelölésköteles	
Vízi szervezetekre való veszélyesség			Kifejezetten veszélyes	