

A large circular collage in the background features three distinct images of soybeans: a close-up of yellow seeds, a field of mature golden-brown plants, and a green seedling with emerging leaves.

RODEO PLUS



Kwizda

Agro

Számos szójatermesztő tapasztalta meg azt, hogy a tenyészidőszak végére a szójaállomány felgyomosodott. A gyomos szóját nehezebben, jelentős többlet pergesi veszteséggel lehet betakarítani. Ezt a problémát a szója betakarítás előtti gyomirtásával, a Rodeo Plus alkalmazásával megoldhatjuk.

Felhasználása és dózisa

Kultúra	Károsító	Kezelés ideje	Dózis (l/ha)	Permetlé (l/ha)
szója	magról kelő egy- és kétszikű gyomok	30% nedvességtartalomnál	3,0	150–300
tarló és művelés alatt nem álló mezőgazdasági területek	magról kelő egy- és kétszikű gyomok	a gyomnövények intenzív növekedésekor	2,0–3,0	250–300
összes szántóföldi kultúra	magról kelő egy- és kétszikű gyomok	vetés előtt, ill. után a csírázás megindulásáig	2,0–3,0	250–300
szőlő (csemege-szőlő, borszőlő) (3 évesnél idősebb)	magról kelő egy- és kétszikű gyomok	hajtásnövekedés kezdetéig, szüret után, sorkezelés formájában	2,0–3,0	150–300
almatermésűek (alma, körte, birs, naspolya) (3 évesnél idősebb)	magról kelő egy- és kétszikű gyomok	hajtásnövekedés kezdetéig, szüret után, sorkezelés formájában	2,0–3,0	150–300
csonthéjasok (cseresznye, meggy, őszibarack, nektarin, kajsz, ringló, szilva) (3 évesnél idősebb)	magról kelő egy- és kétszikű gyomok	hajtásnövekedés kezdetéig, szüret után, sorkezelés formájában	2,0–3,0	150–300
héjas gyümölcsűek (dió, mandula, mogyoró, gesztenye) (3 évesnél idősebb)	magról kelő egy- és kétszikű gyomok	hajtásnövekedés kezdetéig, szüret után, sorkezelés formájában	2,0–3,0	150–300

É.V.I: szőlő: 7 nap, **almatermésűek (alma, körte, birs, naspolya):** 28 nap, **csonthéjasok (cseresznye, meggy, őszibarack, nektarin, kajsz, ringló, szilva):** 28 nap, **héjas gyümölcsűek (dió, mandula, mogyoró, gesztenye):** 28 nap, **szója:** 7 nap, **összes szántóföldi kultúra, tarló és művelés alatt nem álló mezőgazdasági területek:** előírás szerinti felhasználás esetén nem szükséges.

Előírt növényvédelmi technológia

Magról kelő kétszikűek esetében azok 4–8 valódi leveles fenológiájában, magról kelő egyszikű gyomnövényeknél 3–5 leveles állapotban kell a kezelést elvégezni. Törekedjünk arra, hogy lehetőleg az engedélyezett legkisebb lémenyiséggel permetezzük ki (így töményebb a permetlé)! A meteorológiai körülményeket figyelembe véve a glifozát hatóanyag 15–25°C között és magas páratartalom mellett a leghatékonyabb. A hatás kifejtéséhez fontos, hogy a kezelést követően 6 órán belül ne hulljon csapadék, és a hatóanyag maradéktalanul felszívódhasson a gyomnövényben.

A készítmény nem szelektív, a gyomnövényektől megvédendő kultúrnövényre nem kerülhet a hatóanyag, mert azt károsíthatja.

Felhasználható:

Betakarítás előtti gyomirtásra szója kultúrában alkalmazható.

Szójában a hüvely sárga-sárgásbarna elszíneződését követően alkalmazható, amikor a szója babszemek nedvességtartalma 30% körül van. A Rodeo Plus hatóanyaga a glifozát-kálium só. A kálium ion miatt (mivel kisebb, mint az izopropil-amin), jobb az áthaladás a kutikulán, a felszívódás, gyorsabban és nagyobb mértékben transzlokálódik a növényben.

Szántóföldi kultúrákban, azok vetése előtt, illetve után a csírázás megindulásáig, akkor, ha az elvetett magvakat legalább 3 cm vastag apró-morzsás talajréteg takarja. 3%-nál kevesebb szervesanyag-tartalmú talajokon ez a technológia nem alkalmazható.

Tarlókezelésre, művelés alatt nem álló mezőgazdasági területek kezelésére évente egyszer használható gyomirtás céljából, a gyomok intenzív növekedése idején.

Szőlő- és gyümölcsültetvényekben: csemegeaszőlő, borszőlő, almatermésű (alma, körte, birs, naspolya), csonthéjas (cseresznye, meggy, őszibarack, nektarin, kajsz, ringló, szilva) és héjas gyümölcsű (dió, mandula, mogyoró, gesztenye) kultúrákban.

Csak 3 évesnél idősebb telepítésekben, védőlemezzel felszerelt szórófejekkel, vagy egyéb speciális permetezés-technikával juttatható ki. A kezelést célszerű a hajtásnövekedés kezdetéig tavasszal, illetve a gyümölcsszüret után ősszel elvégezni. Az alkalmazás során ügyelni kell arra, hogy a permetlé a kultúrnövény zöld növényi részeire (hajtások, levelek) ne kerüljön, mert azokat maradandóan károsítja. A 3 évesnél fiatalabb, még nem elfásodott törzsű csemetéket szintén károsítja a hatóanyag.

Alkalmazása vetőmagtermesztésben nem javasolt.

Hidastraktorral végzett kijuttatás: nagy hasmagasságú (>150 cm) földi géppel csak a permetlé elsodródását gátló cseppnehezítő adalékanyag (pl. Gondor) hozzáadásával juttatható ki a készítmény.

Hatásmechanizmus:

A glifozát hatóanyagot a növény a klorofillt tartalmazó zöld részein keresztül veszi fel. A hatóanyag innen transzlokálódik a gyökerekbe, taracokba, rizómákba. A hatástünetek 1–2 hét után jelentkeznek öregedésben, törpe növésben, levél és hajtásbarnulásban. A folyamat visszafordíthatatlan, az érintett növény elpusztul. Mivel a glifozát a növényben való mozgása folyamán a szaporító képletekbe is eljut így hatása az évelők esetében is a növény pusztulásához, vagy maradandó károsodásához vezet. Hatékonysága ennek megfelelően dózistól függően kiterjed mind az évelő, mind a magról kelő egy- és kétszikű gyomnövényekre.

Összetevők	Formuláció	Forg. kategória	Hatásmód	Kiszerezés
360 g/l glifozát 441 g/l glifozát káliumsó	folyékony vízdoldható koncentrátum (SL)	II.	felszívódó	20 literes kanna
Tárolhatóság			2 év	
Munkaegészségügyi várakozási idő			0 nap, száradásig	
Méhveszélyesség			Nem jelölésköteles	
Tűzveszélyesség			Nem jelölésköteles	
Vízi szervezetekre való veszélyesség			Nem jelölésköteles	

Szaktanácsadóink

Nyugat-Magyarország

Bujdosó Attila	+36 30 6767 043
Erbár Ferenc	+36 20 3665 311
Fehér Tamás	+36 30 982 0763
Kovács András	+36 30 722 5192
Lőrincz Erzsébet	+36 30 861 3123
Mészáros Lili	+36 30 237 4784
Pinczehelyi Zoltán	+36 20 610 7343
Sebestyén István	+36 30 982 0766
Treitz János	+36 30 313 4406
Varga Balázs	+36 30 2222 584
Vejtey Csaba	+36 30 950 1336

Nyugat-magyarországi értékesítési vezető

Fejér vármegye
Somogy vármegye
Veszprém, Komárom-Esztergom vármegye
Vas vármegye
Zala vármegye
Tolna vármegye
Baranya vármegye
Somogy vármegye
Győr-Moson-Sopron vármegye
Tolna vármegye

attila.bujdoso@kwizda.hu

ferenc.erbar@kwizda.hu
tamas.feher@kwizda.hu
andras.kovacs@kwizda.hu
erzsebet.lorincz@kwizda.hu
lili.meszaros@kwizda.hu
zoltan.pinczehelyi@kwizda.hu
istvan.sebestyen@kwizda.hu
janos.treitz@kwizda.hu
balazs.varga@kwizda.hu
csaba.vejtey@kwizda.hu

Kelet-Magyarország

Kiss András	+36 20 947 6141
Csatornai László	+36 30 2126 242
Czene András	+36 30 567 5504
Juhász György	+36 70 4254735
Klein Róbert	+36 30 797 4574
Kolozsvári László	+36 30 580 4357
Lakatos Péter	+36 30 6988 490
Leszko László	+36 20 519 2750
Nagy Zsanett	+36 30 306 0129
Oravecz Péter	+36 30 978 3722
Péter Ákos	+36 30 972 1050
Saska Szabolcs	+36 20 464 0728

Kelet-magyarországi értékesítési vezető

Csongrád-Csanád vármegye
Hajdú-Bihar vármegye
Szabolcs -Szatmár-Bereg, Borsod -Abaúj-Zemplén vármegye
Bács-Kiskun vármegye
Békés vármegye
Szabolcs -Szatmár-Bereg, Borsod -Abaúj-Zemplén vármegye
Jász-Nagykun-Szolnok vármegye
Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye
Heves vármegye
Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye
Pest, Nógrád vármegye

andras.kiss@kwizda.hu

laszlo.csatornai@kwizda.hu
andras.czene@kwizda.hu
gyorgy.juhasz@kwizda.hu
robert.klein@kwizda.hu
laszlo.kolozsvari@kwizda.hu
peter.lakatos@kwizda.hu
laszlo.leszko@kwizda.hu
zsanett.nagy@kwizda.hu
peter.oravecz@kwizda.hu
akos.peter@kwizda.hu
szabolcs.saska@kwizda.hu