

A **Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal**, mint elsőfokú élelmiszerlánc-felügyeleti szerv (a továbbiakban: engedélyező hatóság), a **Galenika-Fitofarmacija d.o.o.** (Trzaska cesta 515 Brezovica pri Ljubljana, Szlovénia) ügyfél kérelmére a **Promesa gombaölő permetezőszer** forgalomba hozatali és felhasználási engedélyének módosítása tárgyában indult hatósági eljárásban meghozta az alábbi

## HATÁROZATOT.

Az engedélyező hatóság a **Promesa gombaölő permetezőszer** forgalomba hozatali és felhasználási engedélyének megadásáról szóló 6700/0080123-1/2024. NÉBIH számú határozatot – egyéb rendelkezések változatlanul hagyása mellett – az alábbiak szerint

### m ó d o s í t j a:

*I. Az engedélyokirat 1.3. pontja helyébe az alábbi szövegrész lép:*

**1.3. Engedélyokirat érvényessége: 2028. május 31.**

Az engedélyokirat egyéb előírásai változatlanok.

Az engedély módosítási eljárás díja 25.000 Ft, amelyet az ügyfél köteles a kibocsátott számla alapján megfizetni.

Jelen határozat ellen keresetlevéllel közigazgatási per indítható.

A keresetlevelet a Fővárosi Törvényszéknek címezve a határozat közlésétől számított harminc napon belül a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalhoz (a továbbiakban: NÉBIH) kell benyújtani.

A jogi képviselővel eljáró fél, valamint belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet a keresetlevelet elektronikus úton, a <http://anyk.nebih.gov.hu> weboldalon keresztül elérhető elektronikus űrlap (ÁNYK nyomtatvány) használatával köteles benyújtani.

A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart. Tárgyalás tartása a keresetlevélben kérhető, ennek elmulasztása miatt igazolásnak helye nincs.

## INDOKOLÁS

„A Határozat Indoklás része nem nyilvános”

Budapest, 2025. október 15.

**dr. Nemes Imre Zoltán**

8360/92876-2/2025 Nébih  
elnök  
nevében és megbízásából


**Szűcs Csaba**  
igazgató

*P.H.*

**Kapja:**

1. Ügyfél a meghatalmazott útján értesül
2. Irrattár

(592/2025)



## Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

Növényvédelmi Igazgatóság

✉ 1118 Budapest, Dayka Gábor utca 3.

☎ +36 (30) 216-6303

E-mail: [ppp.registration@nebih.gov.hu](mailto:ppp.registration@nebih.gov.hu)

[portal.nebih.gov.hu](http://portal.nebih.gov.hu)

### FORGALOMBA HOZATALI ÉS FELHASZNÁLÁSI ENGEDÉLYOKIRAT

#### 1. A növényvédő szer engedélyokirat azonosítási adatai:

- 1.1. Engedélyokirat száma: **6700/0080123-1/2024. NÉBIH**
- 1.2. Növényvédő szer neve: **Promesa**
- 1.3. Engedélyokirat érvényessége: **2028. május 31.**
- 1.4. Engedélyokirat tulajdonosa: **Galenika-Fitofarmacija d.o.o.**  
Trzaska cesta 515 Brezovica pri Ljubljana, Szlovénia

#### 2. A növényvédő szer adatai:

- 2.1. növényvédő szer gyártója: **Galenika-Fitofarmacija a.d.**  
Batajnicketi drum bb 11080 Belgrade Serbia
- 2.2. növényvédő szer rendeltetése: **gombaölő szer**
- 2.3. növényvédő szer formulációja: **vizes szuszpenzió koncentrátum (SC)**
- 2.4. növényvédő szer összetétele:

- 2.4.1. hatóanyag
- ISO név **azoxistrobin**
- CAS szám **131860-33-8**
- IUPAC név **metil (E)-2-(2-(2-(2-cianofenoxi)-  
pirimidin-4-iloxi-fenil)-3-metoxiakrilát**
- tiszta hatóanyag részaránya **250 g/l**

#### 3. Minőségi követelmények:

- 3.1. Hatóanyag tartalom
- azoxistrobin (GC-FID) **22,93 ± 1,14 % (m/m)**
- 3.2. Fizikai-kémiai tulajdonságok: **Meg kell felelnie az „SC” formuláció FAO követelményeinek**

Tájékoztató jellegű adatok:

**Megjelenés:** krém színű, festék szagú folyadék**pH (1%-os szuszpenzió):** 6,58**Lobbanáspont:** <100°C**Sűrűség (20°C):** 1,09 g/cm<sup>3</sup>**Felületi feszültség (0,4%-os hígítás, 20°C):** 41,17 mN/m**Tartós habképződés (0,05%-os emulzió, 1 perc):** 0 ml**4. Felhasználására vonatkozó előírások:**

Kultúra	Károsító	A kezelések évenkénti maximális száma	Két kezelés között eltelt minimális időtartam (nap)	Dózis (l/ha)	Permetlé (l/ha)	A kezelés ideje (fenológiai állapot szerint)
<b>búza</b> <i>őszi és tavaszi</i>	lisztharmat, vörösszoda (levélrozsa), szeptóriás levélfoltosság, szeptóriás pelyvafoltosság alternáriás és kladospóriumos kalászenészedés	1	-	1,0	200-300	szárbaindulás kezdetétől (BBCH 30) a virágzás végéig (BBCH 69)
<b>rozs</b>	barnarozsda (levélrozsa), rinhospóriumos levélfoltosság	1	-	1,0	200-300	szárbaindulás kezdetétől (BBCH 30) a virágzás végéig (BBCH 69)
<b>burgonya</b>	alternáriás betegség	3	10	0,5	300-400	első bimbók megjelenésétől (BBCH 51) bogyóérésig (BBCH 85)
<b>őszi káposztarepce</b>	szklerotíniás betegség (fehérpenész), botritiszes betegség (szürkepenész), alternáriás levél- és becőfoltosság	1	-	1,0	200-300	szárnövekedés kezdetétől (BBCH 30) virágzás végéig (BBCH 69)
<b>vöröshagyma</b>	peronoszpóra, botritiszes betegség (szürkepenész)	3	7	0,8	200-500	negyedik levél megjelenésétől (BBCH 14) 50%-os levéldőlésig (BBCH 48)
<b>fejes káposzta, kínai kel, karfiol szabadföldi</b>	alternáriás betegség	2	12	0,8	200-600	hatleveles állapottól (BBCH 16) fejesedés kezdetéig (BBCH 41)
<b>sárgarépa szabadföldi</b>	alternáriás levélfoltosság	3	7	1,0	200-600	hatleveles állapottól (BBCH 16) gyökérvastagodás kezdetéig (BBCH 41)
<b>gumós zeller szabadföldi</b>	szeptóriás levélfoltosság	2	14	1,0	200-600	hatleveles állapottól (BBCH 16) végső gumóvastagság eléréséig (BBCH 49)

Kultúra	Károsító	A kezelések évenkénti maximális száma	Két kezelés között eltelt minimális időtartam (nap)	Dózis (l/ha)	Permetlé (l/ha)	A kezelés ideje (fenológiai állapot szerint)
levél zeller szabadföldi	szeptóriás levélfoltosság	3	10	1,0	200-600	hatleveles állapottól (BBCH 16) végső levélméret eléréséig (BBCH 49)
cukorborsó szabadföldi	peronoszpóra, aszkohitás foltosság	2	14	0,8	200-700	hétleveles állapottól (BBCH 17) az első hüvelyek megjelenéséig (BBCH 69)
fejes saláta szabadföldi és hajtatott	peronoszpóra	2	7	0,8	300-600	négyleveles állapottól (BBCH 14) fejesedés kezdetéig (BBCH 41)
paradicsom szabadföldi	alternáriás betegség, fitoftóras betegség (paradicsomvész)	3	7	0,8	400-800	első oldalhajtás megjelenésétől (BBCH 21) teljes érésig (BBCH 89)

Házikerti felhasználás: 7 – 10 ml / 4-10 l víz / 100m<sup>2</sup>

### **Előírt növényvédelmi technológia:**

**Kalászosokban** (őszi és tavaszi búza, rozs) a védekezést előrejelzésre alapozva, megelőző jelleggel, a fertőzési helyzettől függően javasolt elvégezni. A korai betegségek ellen már a szárbaindulás kezdetén célszerű a készítmény kijuttatása, továbbá a táblázatban felsorolt kalászbetegségek ellen a kalászhányás végén - virágzás elején szükséges védekezni.

**Burgonyában** az *alternáriás betegség* elleni lombvédelmet megelőző jelleggel, előrejelzésre alapozva, de legkésőbb az első tünetek megjelenésekor szükséges elvégezni. A fertőzésre hajlamosító körülmények között a permetezés 10-14 nap múlva megismételhető.

**Őszi káposztarepcében** a *szklerotíniás* és *botritiszes* betegségek elleni permetezést megelőző jelleggel a virágzás első felében indokolt elvégezni. *Alternáriás* foltosság ellen szintén megelőző jelleggel, de legkésőbb az első tünetek megjelenésekor javasolt a védekezés végrehajtása.

**Vöröshagymában** a védekezést megelőző jelleggel, előrejelzésre alapozva, de legkésőbb az első tünetek megjelenésekor szükséges megkezdeni. A *peronoszpóra* elleni permetezéseket javasolt 7-10 naponként végezni a készítményt más hatásmechanizmusú hatóanyagot tartalmazó gombaölő szerrel váltogatva.

**Káposztafélékben** (fejes káposzta, kínai kel, karfiol) a készítményt megelőző jelleggel, előrejelzésre alapozva, de legkésőbb az első tünetek megjelenésekor szükséges kijuttatni. A fertőzésre hajlamosító körülmények között a permetezés 2-3 hét múlva megismételhető.

**Sárgarépában** és **zellerben** a készítményt megelőző jelleggel, előrejelzésre alapozva, de legkésőbb az első tünetek megjelenésekor szükséges kijuttatni. A fertőzésre hajlamosító körülmények között további permetezések elvégzése válhat szükségessé, amelyek során a készítményt más hatásmechanizmusú hatóanyagot tartalmazó gombaölő szerekkel váltogatva kell kijuttatni.

**Cukorborsóban** a készítményt megelőző jelleggel, előrejelzésre alapozva, de legkésőbb az első tünetek megjelenésekor szükséges kijuttatni. A fertőzésre hajlamosító körülmények között a kezelés egy további alkalommal megismételhető, amelynek javasolt időpontja a hüvelyek megjelenésének

**Fejes salátában** a *peronoszpóra* ellen a készítményt megelőző jelleggel, előrejelzésre alapozva szükséges kijuttatni. A kezelést javasolt 7-10 nap múlva megismételni.

**Paradicsomban** az *alternáriás betegség* elleni védelmet előrejelzésre alapozva, megelőző jelleggel, de legkésőbb a kezdeti tünetek megjelenésekor, a *fitoftóras betegség (paradicsomvész)* elleni védelmet előrejelzésre alapozva preventív módon indokolt megkezdeni. A fertőzésre hajlamosító körülmények között a további szükséges permetezések során a készítményt más hatásmechanizmusú hatóanyagot tartalmazó gombaölő szerekkel váltogatva kell kijuttatni, 7-14 napos permetezési forduló betartása mellett.

***A készítmény felhasználásakor be kell tartani a hatóanyagcsoportra vonatkozó rezisztencia megelőzési alapelveket!***

***Környezeti tényezők és/vagy agrotechnikai beavatkozások következtében legyengült állományokban a készítmény kijuttatása nem javasolt.***

*Állománypermetezéskor a permetlé mennyiségét a művelésmódtól, a védendő növényfelület nagyságától, és az alkalmazott növényvédelmi berendezés típusától függően kell megválasztani. Minden esetben törekedni kell az egyenletes és teljes permetléfedésre, még a lombzat belsejében is.*

*A készítménnyel végzett kezelés kalászos gabonafélékben kedvezően befolyásolja a zöld lombfelület arányát az állomány öregedése során.*

Hatásmechanizmus:

*Az azoxistrobin sejtlégzést gátló felszívódó hatóanyag (FRAC kód: 11).*

**Légi kijuttatás:** nem engedélyezett

***5. Az emberre, állatra, környezetre való veszélyességre és a biztonságos felhasználásra vonatkozó előírások:***

***5.1. Veszélyességi besorolás:***

***5.1.1. Veszélyességi tulajdonságok:***

<b>A készítmény p.o. LD<sub>50</sub> értéke (patkányon):</b>	<b>&gt;2000 mg/ttkg</b>
<b>Vízi szervezetekre való veszélyesség:</b>	<b>kifejezetten veszélyes</b>
<b>Méhveszélyesség:</b>	<b>nem jelölésköteles</b>
<i>Méhveszélyesség toxicitás alapján*:</i>	<i>nem jelölésköteles</i>
<i>Méhveszélyesség kockázatbecslés alapján*:</i>	<i>nem jelölésköteles</i>
<b>Tűzveszélyességi besorolás:</b>	<b>nem jelölésköteles</b>

---

\* Címkén nem feltüntetendő adat

## 5.1.2. Veszélyességi besorolás a 1272/2008 EK rendelet alapján:

GHS Piktogram:

Figyelmeztetés: **Figyelem****Figyelmeztető mondatok / H-mondatok:**

<b>H332</b>	Belélegezve ártalmas.
<b>H400*</b>	Nagyon mérgező a vízi élővilágra.
<b>H410</b>	Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

**Óvintézkedésre vonatkozó mondatok/ P-mondatok:**

<b>P102</b>	Gyermekektől elzárva tartandó.
<b>P261</b>	Kerülje a gőzök/permet belélegzését.
<b>P270</b>	A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.
<b>P280</b>	Védőkesztyű, védőruha használata kötelező.
<b>P301+P312</b>	LENYELÉS ESETÉN: Rosszullét esetén forduljon orvoshoz
<b>P304+P340</b>	BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni.
<b>P312</b>	Rosszullét esetén forduljon <i>orvoshoz</i> .
<b>P391</b>	A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.
<b>P501</b>	A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.

**Kiegészítő veszélyességi információ:**

<b>EUH208</b>	Benzizotiazolinont (CAS szám: 2634-33-5) tartalmaz. Allergiás reakciót okozhat.
<b>EUH401</b>	Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell tartani a használati utasítás előírásait.

**5.2. Különleges P-mondatok:**

<b>SP 1</b>	A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon levő vízelvezetőkön keresztül való szennyeződést!
<b>SPe 2</b>	A talajvíz védelme érdekében lúgos talajokon (pH>7,2 KCl, ill. CaCl <sub>2</sub> oldatban), valamint fokozottan érzékeny felszín alatti vízminőség védelmi területeken ne használja!

**Spe 3**

A vízi szervezetek védelme érdekében a felszíni vizektől **20 m** távolságban tartson meg egy kezeletlen, növényzettel borított (zárt gyep) biztonsági övezetet!

**5.3. Egyéb környezetvédelmi előírások:**

Az előírt kockázatcsökkentő intézkedésen kívül egyéb korlátozás nem szükséges.

**5.4. Várakozási idők**

5.4.1. Munkaegészségügyi várakozási idő: 0 nap (száradásig)

5.4.2. Élelmezés-egészségügyi várakozási idő:

<i>kultúra</i>	<i>várakozási idő (nap)</i>
<b>paradicsom</b> (szabadföldi)	3
<b>burgonya, sárgarépa</b> (szabadföldi), <b>gumós zeller</b> (szabadföldi), <b>vöröshagyma, cukorborsó</b> (szabadföldi), <b>fejes káposzta</b> (szabadföldi), <b>kínai kel</b> (szabadföldi), <b>karfiol</b> (szabadföldi), <b>fejes saláta</b> (szabadföldi és hajtatott), <b>levélzeller</b> (szabadföldi)	14
<b>őszi káposztarepce</b>	21
<b>búza</b> (őszi és tavaszi), <b>rozsa</b>	35

**5.5. Munkaegészségügyi óvórendszabályok:****5.5.1. Egyéni védőfelszerelés**

5.5.1.1. Előkészítőknak: védőkesztyű, szemvédő/arcvédő, védőruha, védőlábbeli

5.5.1.2. Kijuttatóknak: védőkesztyű, szemvédő, FFP3SL jelű szelepes félálarc, védőruha, védőlábbeli

**5.5.2. Elsősegélynyújtás:**

*Mérgezőskor, allergiás megbetegedés esetén, vagy annak gyanújakor a munkát azonnal félbe kell szakítani, majd helyszíni elsősegélynyújtás után orvosi, intézeti ellátást kell biztosítani.*

*Bőrrel való érintkezés esetén a bőrt bő vízzel, szappannal meg kell tisztítani. Szembe jutás esetén a szemet azonnal, bő vízzel, legalább 15-20 percig öblögetni. Lenyelés esetén, ha a sérült tudatánál van, a száját vízzel ki kell öblíteni, egy-két pohár vízzel itatni, orvosi ellátást biztosítani. TILOS hánytatni!*

*Terápia: tüneti-megfigyelő kezelés*

*Ellenanyag: specifikus antidótuma nincs*

**6. Kiszерelés, csomagolás**

6.1. Kiszерelés térfogata/tömege: 10 ml, 50 ml, 200 ml, 250 ml, 500 ml, 1 l; 5 l; 10 l; 20 l

6.2. Csomagolószer anyaga: HDPE, HDPE/PA

**7. Eltarthatósági idő:**

Fizikai-kémiai tulajdonságait **eredeti zárt csomagolásban, száraz, hűvös helyen, szabályos növényvédő szer raktárban** legalább két évig megőrzi.

*Tájékoztató adat:* A gyártó által vállalt eltarthatósági idő **3 év**.

**8. Forgalmazási kategória:**

500 ml, 1 l, 5 l, 10 l, 20 l                   **II.**

10 ml, 50 ml, 200 ml, 250 ml           **III.**

Budapest, 2025. október 15.

**dr. Nemes Imre Zoltán**  
elnök  
nevében és megbízásából

**Szűcs Csaba**  
igazgató

*P.H.*